

Paso de forma polar a forma cartesiana o binómica





Conocemos la forma polar de un número complejo, $z = M_\alpha$, y queremos obtener su forma cartesiana, $z = (a,b)$, o binómica, $z = a+bi$. Para que hagas este paso de la forma más rápida y sencilla posible, conviene distinguir dos casos:

- * Caso 1: el número complejo es real o imaginario puro.
- * Caso 2: el número complejo no es real ni imaginario puro.

En el caso 1 no es necesario usar la calculadora, el paso se puede hacer automáticamente; pero en el caso 2 hay que usar la calculadora.

Resolución del caso 1

Si visualizas la posición del afijo de z , te será muy sencillo determinar los valores de a y b . Te presentamos las gráficas y, a partir de ellas, verás el resultado:


Caso 1a	Caso 1b	Caso 1c	Caso 1d
			
$z = M_0^\circ = (M,0) = M$	$z = M_{90^\circ} = (0,M) = Mi$	$z = M_{180^\circ} = (-M,0) = -M$	$z = M_{-90^\circ} = (0,-M) = -Mi$

Ejemplos

Ejemplo 1	Ejemplo 2	Ejemplo 3	Ejemplo 4
$z = 5_0^\circ = (5,0) = 5$	$z = 5_{90^\circ} = (0,5) = 5i$	$z = 5_{180^\circ} = (-5,0) = -5$	$z = 5_{-90^\circ} = (0,-5) = -5i$

Resolución del caso 2

Resolvemos este caso basándonos en las definiciones de seno y coseno. Sabemos que si el punto P_α está en la circunferencia trigonométrica, $P_\alpha = (\cos \alpha, \sin \alpha)$. A partir de eso, vamos a calcular las coordenadas del afijo de z , que llamamos A en la figura de la derecha. Los triángulos OAB y $OP_\alpha Q_\alpha$ son semejantes por ser triángulos rectángulos con un ángulo agudo común. Tenemos que $OP_\alpha = 1$ y $OA = M$.



$$\frac{\overline{OB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OQ_\alpha}}{\overline{OP_\alpha}} \Rightarrow \frac{a}{M} = \frac{\cos \alpha}{1} \Rightarrow a = M \cdot \cos \alpha; \quad \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{P_\alpha Q_\alpha}}{\overline{OP_\alpha}} \Rightarrow \frac{b}{M} = \frac{\sin \alpha}{1} \Rightarrow b = M \cdot \sin \alpha$$

Aunque hemos representado la figura en el primer cuadrante, el razonamiento es correcto para todos los demás.

$$\text{Obtenemos: } z = M_\alpha \Rightarrow \begin{cases} a = M \cdot \cos \alpha \\ b = M \cdot \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow z = (M \cdot \cos \alpha, M \cdot \sin \alpha) = M \cdot \cos \alpha + i \cdot M \cdot \sin \alpha$$

Ejemplo 5: Escribe en forma cartesiana 3_{40° con cuatro cifras significativas.

Resolución: $3_{40^\circ} = (3 \cdot \cos 40^\circ, 3 \cdot \sin 40^\circ) = (2,298; 1,928)$.

Nota: hemos usado la calculadora en modo DEG.